

指定医薬部外品

外皮消毒剤

ミックス

消毒用エタノール MIX

「カネイチ」

(エタノール76.9~81.4vol%含有)



10L



500m L



5L

500mLスプレータイプ



スプレー装着時の写真

【旧デザインボトル品】

500mLのみ
2022年3月より
新デザイン品に変更

特 徴

1. 原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。
2. アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。
3. 包丁、まな板等の調理器具、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。

製造販売元

兼一薬品工業株式会社

大阪市西淀川区姫島3丁目5番23号

OSAKA KANEICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD JAPAN

消毒用エタノールMIX「カネイチ」

ETHANOL MIX「KANEICHI」FOR DISINFECTION

承認番号 21900DX00444000
販売開始 2007年3月

貯法：室温保存
他に「保管及び取扱い上の注意」の項参照
使用期限：3年

火気厳禁
第4類 アルコール類 水溶性 危険等級II

成分

本品は、エタノール76.9～81.4vol%を含む。
添加物としてイソプロパノールを含む。

効能・効果

手指・皮膚の洗浄・消毒

用法・用量

塗擦又は脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を守ること。
- (2) 本剤は希釈せず原液のまま使用すること。
- (3) 局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないこと。
- (4) 広範囲又は長時間使用する場合、蒸気の吸入に注意すること。
- (5) 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
- (6) 小児に使用させる場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (7) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には直ちに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (8) 外用にのみ使用し、内服しないこと。

使用上の注意



してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人には使用しないこと。
患部が広範囲の人、深い傷やひどいやけどの人。
2. 次の部位には使用しないこと。
損傷のある手指・皮膚、口唇等の粘膜の部分、目の周り(局所刺激作用があります)。

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、皮膚に発疹・発赤、かゆみがあらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手の届かないところに保管すること。
- (2) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (3) 直射日光の当たらない、なるべく涼しい所に密栓して保管すること。
- (4) 塗装された物等に使用した場合、色が落ちる恐れがあります。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- (6) 火気を近づけないこと。

包装

100mL、500mL、500mL(スプレー付)、5L、10L、16L

梱包

100mL×100本入、500mL×20本入、5L×3本入
500mL(スプレー付)×10本入、10L×2本入、16L×1本入

JANコード

100mL 4 987556 241070	500mL 4 987556 241018	500mL(スプレー付) 4 987556 241049
5L 4 987556 241025	10L 4 987556 241032	16L 4 987556 241056

消毒効果 (in vitro試験)

in vitroにおける消毒効果について試験した結果、
いずれの供試菌に対しても15秒以内で消毒できる
ことが確認されました。

	供試菌	殺菌時間
グラム陽性菌	黄色ブドウ球菌 (<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC6538P)	15秒以内
	大腸菌 (<i>Escherichia coli</i> IF03972)	15秒以内
グラム陰性菌	緑膿菌 (<i>Pseudomonas aeruginosa</i> IF03452)	15秒以内
	腐敗菌 (<i>Proteus vulgaris</i> IF03851)	15秒以内
	肺炎桿菌 (<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC13883)	15秒以内
真菌	カンジタ菌 (<i>Candida albicans</i> IF01594)	15秒以内


〇アルコールの家庭での使い方〇

1 調理器具の消毒



洗浄した調理器具の水気を切り、綺麗なガーゼ、布等に浸して清拭するか、又はスプレーする。
週に2～3回しておく
いつも清潔でいられます。

2 レンジ、換気扇、冷蔵庫などの掃除



アルコールは油を溶かす性質があるので、レンジ・換気扇・冷蔵庫などの掃除が容易に出来ます。但し、火気には十分に注意して掃除しましょう。

3 生ゴミの嫌な臭いを消臭



アルコールを生ゴミのポリ袋にひと吹きし、袋を閉じれば嫌な臭いを防ぐことができます。

4 カビ予防に



カビが発生しやすい洗面台・風呂場にスプレーしておくことカビの発生を抑えます。

5 その他の洗浄・消毒

アルコールは消毒・殺菌効果があるので、テーブル、ドアノブ、トイレ等の洗浄・消毒に綺麗なガーゼ、布等に浸して清拭するか、又はスプレーして使用することが出来ます。

承認番号	21900DX00444000
承認年月	2007年 3月
販売開始	2007年 3月

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

外皮消毒剤

指定医薬部外品

消毒用エタノール MIX 「カネイチ」

貯 法：室温保存
使用期限：3年
(容器等に最終年月表示)

ETHANOL MIX 「KANEICHI」 FOR DISINFECTION

- 【特徴】
- (1) 速乾性で、べたつき等が残りません。
 - (2) エタノール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。
 - (3) エタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- (1) 次の人は使用しないこと。
患部が広範囲の人。深い傷やひどいやけどの人。
- (2) 次の部位には使用しないこと。
損傷のある手指・皮膚・口唇等の粘膜の部分、目の周り（局所刺激作用があります）。



相談すること

- (1) 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 1. 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 2. 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。
 3. 医師の治療を受けている人。
- (2) 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 1. 本剤の使用後又は使用中に、皮膚に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状があらわれた場合。
 2. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

【成分】本品は、エタノール 76.9～81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノールを含む。

【効能・効果】手指・皮膚の洗浄・消毒

【用法・用量】塗擦又は脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を守ること。
- (2) 本剤は希釈せず原液のまま使用すること。
- (3) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないこと。
- (4) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には直ちに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (6) 同じ部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 小児の手の届かないところに保管すること。
- (2) 直射日光の当たらない、なるべく涼しい所に密栓して保管すること。
- (3) 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないこと。
- (4) 本剤はアルコールを含有しているため、床にこぼれると変色する場合がありますので注意すること。
- (5) 火気を近づけないこと。
- (6) 使用期限が過ぎた製品は使用しないこと。

【包装】100mL、500mL、5L、10L、16L

【梱包】100mL×100本入、500mL×20本入、500mL（スプレー付）×10本入、5L×3本入、10L×2本入、16L×1本入

【消費者相談窓口】兼一薬品工業株式会社 医薬情報室 〒555-0033 大阪府大阪市西淀川区姫島3丁目5番23号
TEL 06(6471)3548 FAX 06(6471)5659

【製造販売元】兼一薬品工業株式会社 〒555-0033 大阪府大阪市西淀川区姫島3丁目5番23号