

外皮消毒剤

指定医薬部外品

速乾性擦り込み式手指消毒剤

カネパスソフト

(ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール72v/v%含有)



● 特 徴 ●

- 2成分（ベンザルコニウム塩化物とエタノール）の消毒剤を配合しているため、広い抗菌スペクトルと迅速な殺菌作用を示します。
- 手荒れ防止剤としてグリセリンとミリスチン酸イソプロピルを配合しているため、手指に優しく、べたつき感の少ない消毒剤です。
- 速乾性であるため、タオルもいらない、緊急対応に適しています。

製造販売元
兼一薬品工業株式会社
大阪市西淀川区堀島3丁目5番23号
OSAKA KANEICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD JAPAN

カネパスソフト

KANEPAS SOFT

火気厳禁 第4類アルコール類
水溶性 危険等級II

使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

- 次の人は使用しないこと
患部が広範囲の人、深い傷やひどいやけどの人
- 次の部位には使用しないこと
損傷のある手指・皮膚・口唇等の粘膜の部分、目の周り
（局所刺激作用があります）

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
(3) 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

効能・効果

手指・皮膚の洗浄・消毒

用法・用量

そのまま手指に塗布又は塗擦

＜用法・用量に関連する注意＞

- 定められた用法・用量を守ること。
- 本剤は希釈せずに原液のまま使用すること。

- 血液や汚物等が付着している場合には、石ケンで良く洗浄してから使用すること。
- 同じ部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
- 小児に使用させる場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には直ちに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- 本剤は外用にのみ使用し、内服しないこと。

成分

ベンザルコニウム塩化物 0.05w/v%、添加物としてエタノール、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピルを含む。

保管及び取扱い上の注意

- 小児の手の届かないところに保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
- 直射日光の当たらない、なるべく涼しい所に密栓して保管すること。
- 本剤はアルコールを含有しているため、床にこぼれると変色する場合がありますので注意すること。
- 使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。
- 火気を近づけないこと。

包装・梱包・JANコード

包装	梱包	JANコード
100 mL	10本入	4987556233051
500 mL	10本入	4987556233013
1000 mL	10本入	4987556233020
5 L	3本入	4987556233037
10 L	2本入	4987556233044

(スプレー式)
(ポンプ付)
(ポンプ付)

カネパスソフト 使用方法



1 ポンプを1回押し、薬液を手にとります。



2 指先と爪部分を反対側の手のひらにこすりつけて各方向から爪の隅りをこすります。



3 手のひらにムラなくこすり合わせた後、手の甲にも延ばすようにこすります。



4 指を組み合わせるような形で指の間をこすります。



5 洗い残されるのが多い親指の背側も反対の手でよくこすります。



6 手首にも十分すりこみます。

承認番号	22100DZX00080000
承認年月	2009年 1月
販売開始	2009年 3月

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

指定医薬部外品

外皮消毒剤

速乾性擦り込み式手指消毒剤

カネパスソフト

火気厳禁

貯 法：室温保存
使用期限：5年
(容器等に最終年月表示)

KANEPAS SOFT

第4類アルコール類
水溶性 危険等級II

- 【特徴】(1) 速乾性で、べたつき等が残りません。また、タオルは必要ありません。
(2) 配合成分（ベンザルコニウム塩化物、エタノール）は、広い抗菌スペクトルと迅速な殺菌作用を示します。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は使用しないこと。
患部が広範囲の人。深い傷やひどいやけどの人。
- 次の部位には使用しないこと。
損傷のある手指・皮膚・口唇等の粘膜の部分、目の周り（局所刺激作用があります）。



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。
 - 医師の治療を受けている人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 本剤の使用途中又は使用後に、皮膚に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状があらわれた場合。
 - 5～6日間使用しても症状がよくならない場合。

【成分】ベンザルコニウム塩化物 0.05w/v%、添加物としてエタノール、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピルを含む。

【効能・効果】手指・皮膚の洗浄・消毒

【用法・用量】そのまま手指に塗布又は塗擦

<用法・用量に関連する注意>

- 定められた用法・用量を守ること。
- 本剤は希釈せず原液のまま使用すること。
- 本剤は外用にのみ使用し、内服しないこと。
- 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には直ちに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 同じ部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。

【保管及び取扱い上の注意】

- 小児の手の届かないところに保管すること。
- 直射日光の当たらない、なるべく涼しい所に密栓して保管すること。
- 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないこと。
- 本剤はアルコールを含有しているため、床にこぼれると変色する場合がありますので注意すること。
- 火気を近づけないこと。
- 使用期限が過ぎた製品は使用しないこと。

【包装】100mL、500mL、1000mL、5L、10L

【梱包】100mL(スプレー付)×10本入、500mL(ポンプ付)×10本入、1000mL(ポンプ付)×10本入、5L×3本入、10L×2本入

【消費者相談窓口】兼一薬品工業株式会社 医薬情報室 〒555-0033 大阪府大阪市西淀川区姫島3丁目5番23号
TEL 06(6471)3548 FAX 06(6471)5659

【製造販売元】兼一薬品工業株式会社 〒555-0033 大阪府大阪市西淀川区姫島3丁目5番23号