

外皮消毒剤

指定医薬部外品

ヒアルロン酸  
配合

速乾性擦り込み式手指消毒剤

# カネパスVD

(エタノール 76.9~81.4vol%含有)



80mL



300mL



500mL



1L



5L

## 特 徴

- 添加物としてクエン酸と硫酸亜鉛を配合することにより、ノロウイルスなどのノンエンベロープウイルスを含む各種ウイルス・真菌・細菌など広範囲な微生物に対して、迅速な消毒効果を発揮します。
- 手荒れ防止剤としてグリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-アルギニンエチル-DL-ピロリドンカルボン酸塩及びヒアルロン酸を配合しているため、手指に優しく、べたつき感の少ない消毒剤です。
- 速乾性であるので、タオルもいらない、緊急対応に適しています。

製造販売元

兼一薬品工業株式会社

大阪市西淀川区姫島3丁目5番23号

OSAKA KANEICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD JAPAN

指定医薬部外品

外皮消毒剤（速乾性擦り込み式手指消毒剤）

|      |                  |
|------|------------------|
| 承認番号 | 22700DZX01734000 |
| 承認年月 | 2015年10月         |
| 販売開始 | 2015年10月         |

# カネパス VD

KANEPAS VD

火気厳禁 第4類アルコール類  
水溶性 危険等級Ⅱ

## 使用上の注意



### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

- 次の人は使用しないこと  
患部が広範囲の人、深い傷やひどいやけどの人
- 次の部位には使用しないこと  
損傷のある手指・皮膚・口唇等の粘膜の部分、目の周り  
（局所刺激作用があります）

### 相談すること



- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人  
(3) 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症状        |
|------|-----------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ |

## 効能・効果

手指・皮膚の洗浄・消毒

## 用法・用量

そのまま手指に塗布又は塗擦

<用法・用量に関連する注意>

- 定められた用法・用量を守ること。
- 本剤は希釈せずに原液のまま使用すること。
- 血液や汚物等が付着している場合には、石ケンで良く洗浄してから使用すること。

- 同じ部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
- 小児に使用させる場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には直ちに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- 本剤は外用にのみ使用し、内服しないこと。

## 成分

有効成分としてエタノール（C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O）76.9～81.4vol%、添加物としてグリセリン、クエン酸水和物、ミリスチン酸イソプロピル、N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-アルギニンエチル-DL-ピロリドンカルボン酸塩、硫酸亜鉛水和物、ヒアルロン酸ナトリウムを含む。

## 保管及び取扱い上の注意

- 小児の手の届かないところに保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
- 直射日光の当たらない、なるべく涼しい所に密栓して保管すること。
- 本剤はアルコールを含有しているため、床にこぼれると変色する場合がありますので注意すること。
- 使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。
- 火気を近づけないこと。

## 包装・梱包・JANコード

| 包装      | 梱包   | JANコード        |        |
|---------|------|---------------|--------|
| 80 mL   | 10本入 | 4987556235062 |        |
| 300 mL  | 10本入 | 4987556235024 | （ポンプ付） |
| 500 mL  | 10本入 | 4987556235031 | （ポンプ付） |
| 1000 mL | 10本入 | 4987556235048 | （ポンプ付） |
| 5 L     | 3本入  | 4987556235055 | （コック付） |

## 消毒効果（in vitro試験）

カネパスVDのin vitroにおける消毒効果について試験した結果、いずれの供試菌に対しても15秒以内で消毒できることが確認されました。

| 供試菌    |   | 殺菌時間  |
|--------|---|-------|
| グラム陽性菌 | 黄色ブドウ球菌 ( <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC25923) | 15秒以内 |
| グラム陰性菌 | 大腸菌 ( <i>Escherichia coli</i> ATCC25922)          | 15秒以内 |
|        | 緑膿菌 ( <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC27853)    | 15秒以内 |
|        | 変形菌 ( <i>Proteus mirabilis</i> TOHO140512)        | 15秒以内 |
|        | 肺炎桿菌 ( <i>Klebsiella pneumoniae</i> TOHO140502)   | 15秒以内 |
| 真菌     | カンジタ菌 ( <i>Candida albicans</i> TOHO140801)       | 15秒以内 |

<東邦微生物病研究所>

## ウイルス不活化効果（in vitro試験）

カネパスVDのin vitroにおけるウイルス不活化効果について実使用を想定した条件（タンパク質負荷条件）で試験した結果、いずれの供試ウイルスに対してもウイルスの感染価の減少率（不活化率）99.5%以上減少できることが確認されました。

| 供試ウイルス       |   | 不活化率（%）<br>〔作用時間〕 |
|--------------|---|-------------------|
| ノンエンベロープウイルス | ネコカリシウイルス F-9（ノロウイルス代替）<br><i>Feline calicivirus</i> F-9 ATCC VR-782                | >99.97<br>〔15秒〕   |
|              | アデノウイルス 5型<br><i>Human adenovirus 5 adenoid</i> 75 ATCC VR-5                        | 99.50<br>〔30秒〕    |
| エンベロープウイルス   | インフルエンザウイルス A (H1N1) 型<br><i>Influenza A virus (H1N1)</i> A/PR/8/34<br>ATCC VR-1469 | >99.99<br>〔15秒〕   |

<日本食品分析センター>

|      |               |
|------|---------------|
| 承認番号 | 22700DZX01734 |
| 承認年月 | 2015年10月      |
| 販売開始 | 2015年10月      |

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

指定医薬部外品

外皮消毒剤

速乾性擦り込み式手指消毒剤

# カネパス VD

火気厳禁

貯 法：室温保存  
使用期限：3年  
(容器等に最終年月表示)

KANEPAS VD

第4類アルコール類  
水溶性 危険等級II

- 【特徴】(1) ノロウイルスなどのノンエンベロープウイルスを含む各種ウイルス・真菌・細菌など広範囲な微生物に対して、迅速な消毒効果を発揮します。
- (2) ヒアルロン酸等の手荒れ防止剤を4剤配合しているため、手指に優しく、べたつき感の少ない消毒剤です。
- (3) 速乾性であるので、タオルもいらぬ、緊急対応に適しています。

## ⚠ 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は使用しないこと。  
患部が広範囲の人。深い傷やひどいやけどの人。
- 次の部位には使用しないこと。  
損傷のある手指・皮膚・口唇等の粘膜の部分、目の周り（局所刺激作用があります）。



### 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。
  - 医師の治療を受けている人。
- 次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 本剤の使用後又は使用後に、皮膚に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状があらわれた場合。

【成分】有効成分としてエタノール（C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O）76.9～81.4vol%、添加物として、グリセリン、クエン酸水和物、ミリスチン酸イソプロピル、N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-アルギニンエチル-DL-ピロリドンカルボン酸塩、硫酸亜鉛水和物、ヒアルロン酸ナトリウムを含む。

【効能・効果】手指・皮膚の洗浄・消毒

【用法・用量】そのまま手指に塗布又は塗擦

### <用法・用量に関連する注意>

- 定められた用法・用量を守ること。
- 本剤は希釈せず原液のまま使用すること。
- 血液や汚物等が付着している場合には、石ケンで良く洗浄してから使用すること。
- 同じ部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
- 小児に使用させる場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には直ちに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- 本剤は外用にのみ使用し、内服しないこと。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- 小児の手の届かないところに保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
- 直射日光の当たらない、なるべく涼しい所に密栓して保管すること。
- 本剤はアルコールを含有しているため、床にこぼれると変色する場合がありますので注意すること。
- 使用期限が過ぎた製品は使用しないこと。
- 火気を近づけないこと。

【包装】300mL、500mL、1000mL、5L

【梱包】300mL(ポンプ付)×10本入、500mL(ポンプ付)×10本入、1000mL(ポンプ付)×10本入、5L×3本入

【製造販売元・お問合せ先】 兼一薬品工業株式会社 〒555-0033 大阪府大阪市西淀川区姫島3丁目5番23号  
TEL 06(6471)3548 FAX 06(6471)5659